

Frohon toedieningschema Carboplatine-Gemcitabine-Bevacizumab (ocean)

Naam:	Kuur:	Emetogeniteitsklasse: matig
--------------	--------------	---------------------------------------

Dag 1							Datum:	
Tijd	Pols + temp	RR	Inlooptijd	Infuus-vloeistof	Par	Par	Medicatie	Aandachtspunten
			30 min bij vervolg 15 min	100 ml NaCl 0,9%			Bevacizumab = Avastin® 15 mg/kg i.v.	bij eerste toediening: <ul style="list-style-type: none"> ▪ inloopsnelheid 30 minuten bij tweede e.v. toediening: <ul style="list-style-type: none"> ▪ inloopsnelheid 15 minuten Wanneer eerste toediening zonder infuus gerelateerde reacties verloopt kan infuussnelheid bij de 2 ^e e.v. toediening aangepast worden.
				50 ml NaCl 0,9%				spoelen
							Dexamethason 8 mg p.o.	30 min voor CHT
							Granisetron 2 mg p.o.	30 min voor CHT
				50 ml NaCl 0,9%				spoelen
			30 min	250 ml Gluc 5%			Carboplatine i.v. AUC = 4 (Volgens de Calvert-formule)	
				50 ml NaCl 0,9%				spoelen
			60 min	500 ml NaCl 0,9%			Gemcitabine i.v. 1000 mg/m ²	
				50 ml NaCl 0,9%				spoelen

Naam:	Kuur:	Emetogeniteitsklasse: minimaal
--------------	--------------	---

Dag 8							Datum:	
Tijd	Pols + temp	RR	Inlooptijd	Infuus- vloeistof	Par	Par	Medicatie	Aandachtspunten
							Dexamethason 8 mg p.o.	30 min voor CHT
				50 ml NaCl 0,9%				spoelen
			60 min	500 ml NaCl 0,9%			Gemcitabine = Gemzar® 1000 mg/m ²	
				50 ml NaCl 0,9%				spoelen