

Frohon toedieningsschema Docetaxel-Trastuzumab i.v.-Pertuzumab

Naam:	Kuur:	Emetogeniteitsklasse: 2

Dag 1							Datum:	
Tijd	Pols + temp	RR	Inlooptijd	Infuus-vloeistof	Par	Par	Medicatie	Aandachtspunten
			90 min	250 ml NaCl 0,9%			Trastuzumab i.v. 8 mg/kg (eerste gift)	oplaaddosis 3 wekelijks
			60 min	250 ml NaCl 0,9%			Trastuzumab i.v. 6 mg/kg (vanaf tweede gift)	Observatie patiënt tot 2 uur na eerste toediening van de trastuzumab, daarna niet meer van toepassing.
			60 min	250 ml NaCl 0,9%			Pertuzumab 840 mg (eerste gift)	Observatie patiënt tot 1 uur na toediening van de pertuzumab (3 wekelijks).
			60 min	250 ml NaCl 0,9%			Pertuzumab 420 mg (vanaf tweede gift)	
							Dexamethason 8 mg p.o.	30 min voor CHT
			60 min	250 ml NaCl 0,9% bij ≤ 200 mg, 500 ml NaCl 0,9%. bij > 200 mg			Docetaxel 75 mg/m ²	De eerste vijf minuten op halve snelheid i.v.m. mogelijke overgevoelighedsreactie.
			15 min	50 ml NaCl 0,9%				

Pre-medicatie: Dexamethason						
Medicatie	Dag 0 vóór de CHT	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5
Dexamethason	1 x daags 8 mg p.o. voor de nacht	8 mg, 30 min voor de CHT	8 mg p.o. 's ochtends	1 x daags 8 mg p.o. 's ochtends	1 x daags 4 mg p.o. 's ochtends	1 x daags 4 mg p.o. 's ochtends
		8 mg p.o. 's avonds	8 mg p.o. 's avonds			