

Frohon toedieningschema Paclitaxel – Trastuzumab s.c.

Naam:	Kuur:	Emetogeniteitsklasse: laag
--------------	--------------	-----------------------------------

Dag 1							Datum:	
Tijd	Pols + temp	RR	Inlooptijd	Infuus-vloeistof	Par	Par	Medicatie	Aandachtspunten
			2-5 min				Trastuzumab = herceptin 600 mg/5 ml	subcutaan toedienen 3 wekelijks (17 x)
				100 ml NaCl 0,9%				waakinfuus Observatie patiënt tot 2 uur na eerste toediening van de trastuzumab, daarna niet meer van toepassing.
							Dexamethason 4 mg p.o.	30 min voor CHT
							Clemastine = tavegil® 2 mg i.v. Of Cetirizine 10 mg p.o.	30 min voor CHT 30 min voor CHT
			30 min	50 ml NaCl 0,9%				spoelen
			60 min	250 ml NaCl 0,9%			Paclitaxel = taxol® 80 mg/m ² i.v.	Infuussnelheid eerste 15 min halveren. Bij eerste 2 giften iedere 15 min de RR en pols meten. Vanaf derde gift voor en na toediening RR en pols.
				50 ml NaCl 0,9%				0,2 micron filter spoelen

Naam:	Kuur:	Emetogeniteitsklasse: laag
--------------	--------------	-----------------------------------

Dag 8							Datum:	
Tijd	Pols + temp	RR	Inlooptijd	Infuus-vloeistof	Par	Par	Medicatie	Aandachtspunten
							Dexamethason 4 mg p.o.	30 min voor CHT
							Clemastine = tavegil® 2 mg i.v. Of Cetirizine 10 mg p.o.	30 min voor CHT 30 min voor CHT
			30 min	50 ml NaCl 0,9%				spoelen
			60 min	250 ml NaCl 0,9%			Paclitaxel = taxol® 80 mg/m ² i.v.	Infuussnelheid eerste 15 min halveren. Bij eerste 2 giften iedere 15 min de RR en pols meten. Vanaf derde gift voor en na toediening RR en pols.
				50 ml NaCl 0,9%				0,2 micron filter spoelen

Naam:	Kuur:	Emetogeniteitsklasse: laag
--------------	--------------	-----------------------------------

Dag 15							Datum:	
Tijd	Pols + temp	RR	Inlooptijd	Infuus-vloeistof	Par	Par	Medicatie	Aandachtspunten
							Dexamethason 4 mg p.o.	30 min voor CHT
							Clemastine = tavegil® 2 mg i.v. Of Cetirizine 10 mg p.o.	30 min voor CHT 30 min voor CHT
			30 min	50 ml NaCl 0,9%				spoelen
			60 min	250 ml NaCl 0,9%			Paclitaxel = taxol® 80 mg/m ² i.v.	Infuussnelheid eerste 15 min halveren. Vanaf derde gift voor en na toediening RR en pols.
				50 ml NaCl 0,9%				0,2 micron filter spoelen
							Dexamethason 4 mg p.o.	30 min voor CHT