

## Frohon toedieningschema AC

<b>Naam:</b>	<b>Kuur:</b>	<b>Emetogeniteitsklasse: hoog</b>
--------------	--------------	-----------------------------------

Dag 1							Datum:	
Tijd	Pols + temp	RR	Inlooptijd	Infuus-vloeistof	Par	Par	Medicatie	Aandachtspunten
							Aprepitant 125 mg p.o.	1 uur voor de CHT
							Dexamethason 12 mg p.o.	30 min voor de CHT
							Granisetron (Kytril®) 2 mg p.o.	30 min voor de CHT
				50 ml NaCl 0,9%				spoelen
			±10 min	100 ml NaCl 0,9%			Doxorubicine = adriamycine® 60 mg/m <sup>2</sup>	Snellopend toedienen zonder infuuspomp. Voor aansluiten controle infuus d.m.v. hevelproef.
				50 ml NaCl 0,9%				spoelen
			30 min	100 ml /250 ml NaCl 0,9%			Cyclofosfamide = endoxan® 600 mg/m <sup>2</sup>	
				50 ml NaCl 0,9 %				spoelen

**Aandachtspunt:** 24 uur na toediening AC Dose Dense ,

G-CSF = Granulocyte-colony stimulating factor (= Neulasta ), s.c. toedienen