

CRASHKAART ONCOLYTICA versie 6



BLAARVORMEND Een stof die blaren en/of weefselbeschadiging kan veroorzaken. Bij ontstaan necrose: overleg met chirurg voor excisie
IRRITEREND Een stof die pijn op de injectieplaats of langs de ader kan veroorzaken, zonder dat dit resulteert in aanhoudende ontsteking of weefsel schade
NIET-BLAARVORMEND Een stof waarvan niet waarschijnlijk is dat het beschadiging of irritatie zal veroorzaken

STOFNAAM	EXTRAVASATIE	SPECIFIEKE MAATREGELEN	OOGCONTACT	HUDCONTACT	INACTIVATIE OMGEVING	
ALDESLEUKINE	Niet bekend	1	A	B	E	geen risico
AMSACRINE	Ernstige weefselreactie (necrose mogelijk)	5 + 1 + 7	A	B	E	6 dagen
ARSEENTRIOXIDE	Waarschijnlijk irritatie en pijnlijke reactie	1	A	B	F	Geen termijn ivm lange duur therapie
ASPARAGINASE	Geen ernstige reacties	1	A	B	E	2 dagen
AZACITIDINE	Geen ernstige reacties (wordt subcutaan gegeven)	1	A	B	E	3 dagen
AZATHIOPRINE	Waarschijnlijk irritatie en pijnlijke reactie	-	A	B	E	4 dagen
BCG-VACCIN	n.v.t.	-	A	B+C	F	7 dagen
BENDAMUSTINE	Beperkte informatie, mogelijk huidafwijkingen, necrose zeldzaam	1 (+ 7 indien van toepassing)	A	D	I	2 dagen
BLEOMYCINE	Erythem/oedeem/pijn kan ontstaan	1	A	B	E	3 dagen
BORTEZOMIB	Roodheid, zwelling	1	A	B	E	3 dagen
BRENTUXIMAB	Geen ernstige reactie	1	A	B	E	7 dagen
VEDOTINE	Niet bekend	1 + 7	A	B	E	2 dagen
CABAZITAXEL	Geen ernstige reacties	1	A	B	E	7 dagen
CARBOPLATINE	Geen ernstige reacties	1	A	B	E	4 dagen
CARFILZOMIB	Geen ernstige reactie	1	A	B	E	0 dagen
CARMUSTINE	Irritatie en necrose-vorming is mogelijk	1 + 7	A	B	E	2 dagen
CHLORMETHINE	Ernstige weefselreactie	2 + 1	A	D	G + E	2 dagen
CISPLATINE	Geen ernstige reacties	5 + 1	A	B	E	7 dagen
CLADRIBINE	Geen ernstige reacties (huidreacties)	1	A	B	E	3 dagen
CLOFARABINE	Niet bekend	1	A	B	E	2 dagen
CYCLOFOSFAMIDE	Geen ernstige reacties (ontstaan ulcus)	1	A	B	E	3 dagen
CYTARABINE	Geen ernstige reacties	1	A	B	F	2 dagen
DACARBAZINE	Geen ernstige reacties (ontstaan ulcus)	1+ CAVE! Vermijd zonlicht	A	B	E	24 uur
DACTINOMYCINE	Ernstige weefselreactie	1 + 7	A	B	J	2 dagen
DAUNORUBICINE	Ernstige weefselreactie	5 + 1 + 3 + 7	A	B	F	6 dagen
DAUNORUBICINE LIPOSOMAAL	Pijn, oedeem, erythem	1 (+ 7 indien van toepassing)	A	B	E	6 dagen
DECITABINE	Geen ernstige reacties	1	A	B	F	2 dagen
DOCETAXEL	Pijn, oedeem, erythem	4 + 6	A	B	E	4 dagen
DOXORUBICINE	Ernstige weefselreactie	5 + 1 + 3 + 7	A	B	F	6 dagen
DOXORUBICINE PEG LIPOSOMAAL	Ernstige weefselreactie	1 + 3 + 7	A	B	F	6 dagen
EPIRUBICINE	Ernstige weefselreactie	5 + 1 + 3 + 7	A	B	F	6 dagen
ERIBULINE	Geen ernstige reacties	1	A	B	K	7 dagen
ETOPOSIDE	Geen ernstige reacties	-	A	B	F	5 dagen
FLUDARABINE	Niet bekend	1	A	B	E	2 dagen
FLUOROURACIL	Geen ernstige reacties	1	A	B	E	2 dagen
GEMCITABINE	Pijn, oedeem, erythem	1	A	B	E	2 dagen
IDARUBICINE	Ernstige weefselreactie	5 + 1 + 3 + 7	A	B	F	6 dagen
IFOSFAMIDE	Ontsteking, pijn	1	A	B	E	3 dagen
IMMUNOCYANINE	n.v.t.	-	A	B	E	n.v.t.
IRINOTECAN	Geen ernstige reacties (lichte zwelling, pijn)	1	A	B	E	4 dagen
MELFALAN	Geen ernstige reacties	1	A	B	E	2 dagen
METHOTREXAAT	Geen ernstige reacties	1	A	B	E	urine 72 uur, faeces 7 dagen
MITOMYCINE	Ernstige weefselreactie	5 + 1 + 7	A	B	H	1 dag
MITOXANTRON	Ernstige weefselreactie (necrose mogelijk)	5 + 1 + 3	A	B	F	7 dagen
NELARABINE	Geen ernstige reacties	1	A	B	E	7 dagen
OXALIPLATIN	Ernstige weefselreactie (necrose mogelijk)	6	A	B	E	7 dagen
PACLITAXEL	Ernstige weefselreactie (pijn, oedeem, erythem)	4 + 6	A	B	I	2 dagen
PEGASPARGASE	Geen ernstige reacties	1	A	B	E	2 dagen
PEMETREXED	Niet bekend	1	A	B	E	24 uur
PENTOSTATINE	Niet bekend	1	A	B	F	3 dagen
PIXANTRON	Geen ernstige reacties	-	A	B	I	Niet bekend
RALTITREXED	Geen ernstige reacties	1	A	B	E	14 dagen
STREPTOZOCINE	Niet bekend	1	A	B	E	2 dagen
TENIPOSIDE	Geen ernstige reacties	-	A	B	E	4 dagen
THIOTEPA	Branderig gevoel	1	A	B	E	5 dagen
TOPOTECAN	Geen ernstige reacties (lichte zwelling, pijn)	1	A	B	E	2 dagen
TRABECTEDINE	Ernstige weefselreactie	9	A	B	E	niet bekend
TRASTUZUMAB EMTANSINE	Geen ernstige reacties	-	A	B	G	7 dagen
VINBLASTINE	Ernstige weefselreactie	4 + 6	A	B	F	2 dagen
VINCRISTINE	Ernstige weefselreactie	4 + 6	A	B	F	2 dagen
VINORELBINE	Ernstige weefselreactie	4 + 6	A	B	E	7 dagen

SPECIFIEKE MAATREGELEN EXTRAVASATIE

- Geen specifieke maatregelen nodig

- Lokale koeling: breng onmiddellijk een droog coldpack aan gedurende minstens 1 uur, daarna een aantal keren per dag, 15 min. per keer
- Natriumthiosulfaat 4% (= 40 mg/ml): injecteer dmv sc injecties gebied met 5 ml 4% (= 40 mg/ml) natriumthiosulfaatoplossing
- Dextrazoxaan: Savene® 1000 mg/m² i.v. binnen 6 uur op dag 1, 1000 mg/m² op dag 2, 500 mg/m² op dag 3 (zie productinformatie) N.B. NIET KOELEN 15 min voor t/m 4 uur na dextrazoxaan toediening
- Hyaluronidase: injecteer 150 IE = 1 ml Hylase® (max 1500 IE) s.c. rondom het aangetaste gebied, afhankelijk van mate van extravasatie
- Dimethylsulfoxide 100% (DMSO): lokaal op huid aanbrengen (elke 8 uur herhalen gedurende minimaal 7 dagen). Laten drogen aan de lucht ivm mogelijk blaarvorming indien onder occlusie.
- Droge warmte: aanbrengen van droge warmte op subjectief aangename wijze (bv hot-cold pack, heet water fles), 4 dd gedurende 20 min.
- Overleg met chirurg voor (vroeg) excisie bij een ernstige reactie.

afdeling
in box
via apotheek
in box
in box
op afdeling
chirurg

OGEN

A Spoel ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheid water

HUDCONTACT

B Was de huid onmiddellijk en grondig met water en zeep

C Spoel de huid met 70% alcohol

D Spoelen met natriumwaterstofcarbonaatoplossing 4,2% daarna met veel water

INACTIVATIE OMGEVING

E Schoonmaken met veel water

F Natriumhypochloriet 5%-oplossing, 100 ml

G 0,1N natronloog, (NaOH), 300 ml

H 0,1N zoutzuur (HCl), 300 ml

I Schoonmaken met veel water en zeep

J Inactiveren met trinitriumfosfaat 5% voor 30 minuten; gebruik 4,4 ml trinitriumfosfaat voor 1 ml gemorst dactinomycine

K Minimaal 3x vegen met 70% alcohol

afdeling
in box
in box
in box
afdeling
apotheek
in box