

Frohon toedieningschema Paclitaxel-Trastuzumab i.v. (kuur 1)

Naam:	Kuur:	Emetogeniteitsklasse: 2
--------------	--------------	--------------------------------

Dag 1							Datum:	
Tijd	Pols + temp	RR	Inlooptijd	Infuus-vloeistof	Par	Par	Medicatie	Aandachtspunten
			90 min	250 ml NaCl 0,9%			Trastuzumab i.v. 8 mg/kg	Oplaaddosis 3 wekelijks (17x)
				±100 ml NaCl 0,9%				Waakinfuus Observatie patiënt tot 2 uur na eerste toediening van de Trastuzumab.
							Dexamethason 8 mg p.o.	
							Ranitidine = Zantac® 50 mg p.o.	
							Clemastine = Tavegil® 2 mg p.o.	
			30 min	50 ml NaCl 0,9%				Spoelen
			60 min	250 ml NaCl 0,9%			Paclitaxel = Taxol® 80 mg/m ²	Infuussnelheid eerste 15 min halveren. Bij eerste 2 giften iedere 15 min de RR en pols meten. Vanaf derde gift voor en na toediening RR en pols.
				50 ml NaCl 0,9%				0,2 micron filter Spoelen

Naam:	Kuur:	Emetogeniteitsklasse: 2
--------------	--------------	--------------------------------

Dag 8							Datum:	
Tijd	Pols + temp	RR	Inlooptijd	Infuus-vloeistof	Par	Par	Medicatie	Aandachtspunten
							Dexamethason 8 mg p.o.	
							Ranitidine = Zantac® 50 mg p.o.	
							Clemastine = Tavegil® 2 mg p.o.	
			30 min	50 ml NaCl 0,9%				Spoelen
			60 min	250 ml NaCl 0,9%			Paclitaxel = Taxol® 80 mg/m ²	Infuussnelheid eerste 15 min halveren. Bij eerste 2 giften iedere 15 min de RR en pols meten. Vanaf derde gift voor en na toediening RR en pols.
				50 ml NaCl 0,9%				0,2 micron filter Spoelen

Naam:	Kuur:	Emetogeniteitsklasse: 2
--------------	--------------	--------------------------------

Dag 15							Datum:	
Tijd	Pols + temp	RR	Inlooptijd	Infuus-vloeistof	Par	Par	Medicatie	Aandachtspunten
							Dexamethason 8 mg p.o.	
							Ranitidine = Zantac® 50 mg p.o.	
							Clemastine = Tavegil® 2 mg p.o.	
			30 min	50 ml NaCl 0,9%				Spoelen
			60 min	250 ml NaCl 0,9%			Paclitaxel = Taxol® 80 mg/m ²	Infuussnelheid eerste 15 min halveren. Vanaf derde gift voor en na toediening RR en pols.
				50 ml NaCl 0,9%				0,2 micron filter Spoelen