

## Frohon toedieningschema Paclitaxel-Trastuzumab i.v. (kuur 2 en verder)

<b>Naam:</b>	<b>Kuur:</b>	<b>Emetogeniteitsklasse: 2</b>
--------------	--------------	--------------------------------

Dag 1							Datum:	
Tijd	Pols + temp	RR	Inlooptijd	Infuus-vloeistof	Par	Par	Medicatie	Aandachtspunten
			60 min	250 ml NaCl 0,9%			Trastuzumab i.v. 6 mg/kg	3 wekelijks (17x)
				50 ml NaCl 0,9%				Spoelen
							Dexamethason 8 mg p.o.	
							Ranitidine = Zantac® 50 mg p.o.	
							Clemastine = Tavegil® 2 mg p.o.	
			30 min	50 ml NaCl 0,9%				Spoelen
			60 min	250 ml NaCl 0,9%			Paclitaxel = Taxol® 80 mg/m <sup>2</sup>	Infuussnelheid eerste 15 min halveren. Vanaf derde gift voor en na toediening RR en pols.
				50 ml NaCl 0,9%				0,2 micron filter Spoelen

<b>Naam:</b>	<b>Kuur:</b>	<b>Emetogeniteitsklasse: 2</b>
--------------	--------------	--------------------------------

Dag 8							Datum:	
Tijd	Pols + temp	RR	Inlooptijd	Infuus-vloeistof	Par	Par	Medicatie	Aandachtspunten
							Dexamethason 8 mg p.o.	
							Ranitidine = Zantac® 50 mg p.o.	
							Clemastine = Tavegil® 2 mg p.o.	
				50 ml NaCl 0,9%				Spoelen
			60 min	250 ml NaCl 0,9%			Paclitaxel = Taxol® 80 mg/m <sup>2</sup>	Infuussnelheid eerste 15 min halveren. Vanaf derde gift voor en na toediening RR en pols.
				50 ml NaCl 0,9%				0,2 micron filter Spoelen

<b>Naam:</b>	<b>Kuur:</b>	<b>Emetogeniteitsklasse: 2</b>
--------------	--------------	--------------------------------

Dag 15							Datum:	
Tijd	Pols + temp	RR	Inlooptijd	Infuus-vloeistof	Par	Par	Medicatie	Aandachtspunten
							Dexamethason 8 mg p.o.	
							Ranitidine = Zantac® 50 mg p.o.	
							Clemastine = Tavegil® 2 mg p.o.	
			30 min	50 ml NaCl 0,9%				Spoelen
			60 min	250 ml NaCl 0,9%			Paclitaxel = Taxol® 80 mg/m <sup>2</sup>	Infuussnelheid eerste 15 min halveren. Vanaf derde gift voor en na toediening RR en pols.
				50 ml NaCl 0,9%				0,2 micron filter Spoelen